

NAJAVAŽNIJE ZA ZAŠTITU

1 ZNANJE I PONAŠANJE

Naučite o HIV/AIDS-u i SPI i ne ponašajte se rizično.

2 TESTIRANJE

Otidite liječniku ako imate simptome ili ste bili u situaciji u kojoj ste se mogli zaraziti HIV-om ili drugom SPI. Neke SPI imaju slabo izražene ili nemaju nikakve simptome, pa ljudi ne znaju da su zaraženi prije nego što bude kasno. Neotkrivena i neliječena HIV infekcija ili SPI može uzrokovati ozbiljne posljedice za opće i spolno zdravstvo.

3 LIJEČENJE

Većina SPI može se izlječiti, a liječenje onih koje se ne mogu izlječiti (npr. zaraza HIV-om) sprečava ili smanjuje napredovanje bolesti i moguće komplikacije, omogućuje dulji i kvalitetniji život oboljelima, te sprečava prenošenje na druge. Liječenje je nužno za oba partnera istovremeno kako se infekcija ne bi prenosila s jednog na drugog.

SAVJETI ZA SMANJENJE RIZIKA

Ne stupajte u spolne odnose ako niste spremni. Niste u riziku od infekcija ako apstinirate (suzdržavate se od spolnih odnosa). Ljubav i bliskost se može iskazati razgovorom, poljupcem, dodirom, zagrljajem. U redu je ne žuriti.

RAZGOVOR S LIJEČNIKOM

> Posavjetujte se s liječnikom prije prvog spolnog odnosa.

RAZGOVOR S PARTNEROM

> Pažljivo birajte spolnog partnera, upoznajte ga i razgovarajte s njim o zaštiti. Spolni odnos s nepoznatom osobom uvijek je rizičan.

VJERNOST - Stabilna i uzajamno vjerna veza daje sigurnost.

ZAŠTITA KONDOMOM - Ako apstinencija nije opcija, kondom je vrlo dobra zaštita protiv HIV-a i većine SPI kao i protiv neželjene trudnoće. Kondom koristite redovito (svaki puta) i ako koristite lubrikant (ovlaživač) uzmite onaj na bazi vode.

REDOVITI LIJEČNIČKI PREGLEDI I HIGIJENA

Vodite brigu o vlastitoj higijeni. Redovito odlažite na pregled kod liječnika, bez obzira na prisutnost znakova bolesti.

BUDITE PAMETNI!

ŠTITITE SEBE I SVOG PARTNERA OD UZROČNIKA BOLESTI KOJE SE PRENOSE SPOLNIM PUTEM.

GDJE SE MOŽETE OBRATITI ZA POMOĆ?

Savjete i pomoć možete zatražiti u Savjetovalištima za HIV u zavodima za javno zdravstvo.

Popis, adrese i radna vremena na www.hzjz.hr i www.zdravlje.hr

ŠTO JE SAVJETOVALIŠTE ZA HIV?

(centar za dobrovoljno savjetovanje i testiranje na HIV)

mjesto u zdravstvenoj ustanovi gdje Vam je omogućena usluga:

- individualnog savjetovanja o rizicima i načinima zaštite od HIV-a i drugih SPI
- testiranja na HIV
- pomoći kod upućivanja na liječenje i psihosocijalnu pomoć u slučaju potrebe

KADA IMATE RAZLOGA ZA SAVJETOVANJE I TESTIRANJE:

- ako ste bili u situaciji u kojoj ste se mogli zaraziti HIV-om
- ako niste koristili zaštitu (kondom) prilikom spolnog odnosa s nepoznatom ili osobom rizičnog ponašanja
- ako ste ikada intravenski uzimali droge
- ako ste imali ili sumnjate da imate neku spolno prenosivu infekciju
- ako ste se tetovirali ili stavljavili piercing, bili na akupunkturi u neadekvatnim uvjetima
- da biste zaštitili vašeg sadašnjeg ili budućeg spolnog partnera / partnericu

KAKO VAM STRUČNJACI U SAVJETOVALIŠTU ZA HIV MOGU POMOĆI?

- da se oslobođite strahova vezanih uz rizike kojima ste možda bili izloženi u prošlosti
- da nehotično ne proširite infekciju na druge
- kako biste dijete zaštitili od moguće infekcije u slučaju trudnoće
- da se što ranije i uspešnije možete liječiti u slučaju pozitivnog nalaza

Savjetovanje će Vam pomoći da pronađete najprikladnije načine zaštite i smanjenja rizika za HIV i druge spolno i krvlju prenosive infekcije. Testiranje omogućuje rano otkrivanje infekcije i liječenje koje sprečava ili smanjuje razvoj mogućih komplikacija, omogućuje dulji i kvalitetniji život oboljelima, te sprečava nehotično širenje infekcije na druge.

Učenici i studenti mogu savjet i pomoći zatražiti u savjetovalištima pri Službama za školsku i sveučilišnu medicinu u zavodima za javno zdravstvo.

PREGLED SPOLNO PRENOSIVIH BOLESTI I SIMPTOMI (ZNAKOVI BOLESTI) KOJI MOGU UKAZIVATI NA ZARAZU

NEMOJTE POKUŠAVATI SAMI POSTAVITI DIJAGNOZU I SAMI SE LIJEČITI, JER TO MOŽE BITI NEUSPJEŠNO I OPASNO. ONO ŠTO PRIMIJETITE MOŽE I NE MORATI BITI ZNAK BOLESTI, ALI VAS UPUĆUJE DA MORATE OTIĆI LIJEČNIKU.

BOLEST	SIMPTOMI	BOLEST	SIMPTOMI
KLAMIDIJSKA INFKECIJA	<ul style="list-style-type: none">➤ u većine (3/4) oboljelih nema nikakvih znakova zaraze➤ sluzavo gnojni iscjedak iz spolovila, bol i pekanje pri mokrenju, bol u donjem dijelu trbuha➤ kod prijenosa oralnim spolnim odnosom grlobolj i otežano gutanje	STIDNA UŠLJIVOST	jak svrbež u području spolovila, može biti zahvaćeno i područje oko čmara i pupka, a rjeđe i neki drugi dijelovi tijela
GONOREJA (KAPAVAC, TRIPER, TRIŠA)	<ul style="list-style-type: none">➤ gnojni iscjedak iz spolovila, bolno i učestalo mokrenje➤ kod prijenosa oralnim spolnim odnosom grlobolj i otežano gutanje	SVRAB	jak svrbež (posebice noću) i pojava crvenog osipa na mjestima koja se grebu
SIFILIS (LUES)	<ul style="list-style-type: none">➤ 1. stadij (3 tjedna nakon infekcije): bezbolna ranica (čir) na spolovilu, čmaru ili kod prijenosa oralnim spolnim odnosom u ustima➤ 2. i 3. stadij: opći simptomi, osip, temperatura i teška oštećenja unutrašnjih organa i mozga	HIV / AIDS	HIV zaraza nema karakteristične simptome i dijagnosticira se jedino testiranjem. U ranoj fazi zaraze HIV-om mogu se javiti nespecifični simptomi: <ul style="list-style-type: none">➤ povisena tjelesna temperatura, glavobolja, malakslost, bolovi u mišićima i zglobovima, grlobolja, mučnina, gubitak teka, osip i povećanje limfinskih čvorova. Ako imate takve simptome ili ste bili u situaciji rizičnoj za HIV, testirajte se! HIV infekcija se može otkriti JEDINO TESTIRANJEM!
TRIHOMONIJAZA	bolovi i/ili pekanje pri mokrenju, iscjedak iz spolovila, pekanje i svrbež u području spolovila	HEPATITIS B, C	često nema znakova bolesti, umor, gubitak teka, povraćanje, ponekad žutica
KANDIDIJAZA	jak svrbež (i pečenje) u području spolovila, crvenilo spolovila, bijeli iscjedak iz spolovila		
HEPATITIS A	bolovi u trbuhu, povraćanje, gubitak teka, umor, žutica		
HPV INFKECIJA	<ul style="list-style-type: none">➤ često nema nikakvih znakova zaraze➤ genitalne bradavice (kondilomi) na spolovilu ili oko čmara➤ kod prijenosa oralnim spolnim odnosom promjene i bradavice u ustima		
HERPES	vodeni mjeđuhrići na spolovilu ili kod prijenosa oralnim spolnim odnosom u ustima koji pucaju i stvaraju bolne ranice, pekanje i žarenje u području spolovila, temperatura, glavobolja, slabost		

VAŽNO

Ako osoba ima neku SPI, ima veći rizik za zarazu HIV-om. Često SPI nemaju nikakve simptome koji bi ukazivali na zarazu - zato su briga o zdravlju i redoviti pregledi kod liječnika važni!

ZAPAMTITE! HIV/AIDS I SPI SE ŠIRE I NEZNANJEM.

Liječnički pregled i testiranje omogućuje rano otkrivanje i liječenje koje sprečava moguće komplikacije bolesti i prenošenje na druge.

HIV je virus stečenog nedostatka imuniteta (obrambenog sustava) koji uzrokuje AIDS. Nelječena zaraža HIV virusom je smrtonosna bolest: HIV uništava sposobnost obrambenog sustava koji brani tijelo od infekcija i bolesti.

AIDS je krajnji i najteži stadij HIV zaraze uzrokovani teškim oštećenjem imunološkog sustava koji u oboljelog uzrokuje teške zaraze mikroorganizmima koje inače tijelo uspješno savladava, tumore, pa i smrt. Razdoblje od zaraze HIV-om do razvoja AIDS-a traje više godina, prosječno oko 10 godina.

SIFILIS

Bolest uzrokuje bakterija *Treponema pallidum*, početni stadij očituje se kao tvrda, bezbolna ranica koja ako se ne liječi preraste u mnogo teže probleme.

GONOREJA

Bakterijska bolest poznata i kao kapavac, triper i triša, uzrokuje ju *Neisseria gonorrhoeae*, nije „izbirljiva“ u odabiru lokacije, prvenstveno zahvaća spolne organe a može zahvatiti grlo i zadnje crijevo.

HPV INFEKCIJE

Uzročnik je HPV, vrlo čest virus koji se prenosi bliskim tjelesnim kontaktom. Neki tipovi uzrokuju genitalne bradavice ili kondilome, a neki tipovi mogu uzrokovati rak spolnih organa.

VIRUSNI HEPATITISI

Uzrokuju ih virusi koji napadaju jetru. Mogu se prenijeti i spolnim putem. Hepatitis B i C mogu uzrokovati teška oštećenja i rak jetre. Hepatitis B - bolest od koje se možete zaštiti cijepljenjem.

HERPES

Uzročnik je Herpes virus, očituje se mjeđuričima i ranicama, a prenosi se izravnim dodirom kože. Tegobe se mogu ponavljati godinama!

KLAMIDIJSKA INFEKCIJA

Uzročnik je bakterija *Chlamydia Trachomatis*, najčešća spolno prenosiva bolest za koju mnogi niti ne znaju da je imaju.

KANDIDIJAZA

Česta neugoda, uzročnik je gljiva *Candida albicans* koja uzrokuje probleme samo kada dođe do njenog pretjeranog rasta.

TRIHOMONIJAZA

Uzročnik je jednostanična praživotinja *Trichomonas vaginalis*, često se kasno otkriva jer su simptomi oskudni ili ih nema.



HVALA VAM ŠTO STE PROČITALI OVE INFORMACIJE!
VODITE BRIGU O SVOM ZDRAVLJU!



Hrvatski Zavod za javno zdravstvo



Ministarstvo zdravlja

RAD CENTARA ZA DOBROVOLJNO, ANONIMNO I BESPLATNO TESTIRANJE NA HIV

INFO E-MAIL: hiv.savjet@hzjz.hr • INFO TELEFON: 01 / 46 83 005

VIŠE INFORMACIJA O CENTRIMA ZA SAVJETOVANJE I TESTIRANJE NA HIV (SAVJETOVALIŠTIMA ZA HIV), HIV/AIDS-u i SPI: www.hzjz.hr www.zdravlje.hr

SVAKA SPOLNO AKTIVNA OSOBA MOŽE BITI U RIZIKU ZARAZITI SE HIV-OMILI DRUGOM SPOLNO PRENOSIVOM INFEKCIJOM (SPI).

SAZNAJTE KAKO MOŽETE SMANJITI RIZIK, ŠTO UČINITI AKO PRIMJETITE SIMPTOME ILI MISLITE DA STE BILI U RIZIČNOJ SITUACIJI.

NAUČITE KAKO SE ZAŠTITITI
TESTIRAJTE SE.
LIJEČITE SE.



SPOLNO PRENOSIVE INFEKCIJE (SPI)

- zaraze koje se prenose spolnim kontaktom sa zaraženom osobom
- uzročnici su različiti i brojni mikroorganizmi (virusi, bakterije, praživotinje, paraziti)
- uzrokuju bolesti spolnih organa, neki mogu zahvatiti i druge organe (jetru, obrambeni sustav, mozak ...)

RIZIČNA PONAŠANJA I SIMPTOMI

Zaraža HIV-om ili SPI može se dogoditi svakome tko se rizično ponaša. Rizičan način spolnog života (nezaštićeni spolni odnos sa zaraženom osobom) i uporaba droga (korištenje tuđeg, rabljenog pribora za uzimanje droge) povećavaju rizik za zarazu HIV-om i drugim spolno i krvlju prenosivim infekcijama.

RIZIČNI ČIMBENICI:

- prerano stupanje u spolne odnose (sluznica spolnih organa je kod mladih osjetljivija te lakše dolazi do infekcije)
- veći broj i često mijenjanja seksualnih partnera
- spolni odnosi bez zaštite (kondoma)
- spolni odnosi pod utjecajem alkohola i droga (povećana vjerojatnost odnosa bez zaštite, s više partnera ...)
- prisutnost neke druge SPI od ranije

NAČIN ZARAŽAVANJA

Uzročnici se sa zaraženog čovjeka prenose:

- SPOLNIM ODНОСОМ
(vaginalnim, oralnim ili analnim)

Za neke SPI (npr. hepatitis B, hepatitis C, HIV) spolni odnos nije jedini način zaražavanja, zaraža se može prenijeti i:

- KRVLJU
(korištenjem tuđeg, rabljenog pribora kod intravenskih korisnika droga, postupcima tetovaže, piercinga u neadekvatnim (nestabilnim) uvjetima)

- S MAJKE NA DIJETE
(tijekom trudnoće, poroda i dojenja)

Simptomi koji mogu ukazivati na spolno prenosivu bolest (i kod muškaraca i kod žena):
.....
bol, pečenje, svrbež, otekline ili promjene kože ili sluznice u području spolovila ili čmara, pojačan ili promijenjen iscjedak iz spolovila ili čmara, po-teškoće pri mokrenju, bol ili krvarenje pri spolnom odnosu.

Ako primijetite jedan ili više opisanih simptoma ili ste bili u situaciji u kojoj ste se mogli zaražiti HIV-om ili drugom SPI - OBAVEZNO OTIĐITE LIJEĆNIKU da bi se otkrila zaraža i provelo odgovarajuće liječenje. Neke SPI imaju slabo izražene ili nemaju nikakve simptome. Zato su redoviti liječnički pregledi važni.